



REBRAM

REVISTA BRASILEIRA MULTIDISCIPLINAR

e-ISSN: 2527-2675



Reabilitação oral digital de paciente com grandes alterações oclusais, devido a inúmeras perdas dentárias

Boanerges Araújo Netto Junior*

**Odontologia Integrada Vale do Aço, Mestrado profissional em Odontologia. Instituto e Centro de Pesquisas São Leopoldo Mandic, SL Mandic, Brasil.*

Autor para correspondência: boanergesanjr@gmail.com

Resumo: Paciente do gênero feminino, de 46 anos, chegou à clínica com as seguintes queixas: muita dificuldade para mastigar devido à Prótese Parcial Removível (PPR) superior estar totalmente sem estabilidade. Ela desejava fazer implantes devido a inúmeras perdas dentárias e também desejava melhorar a estética, pois não mostrava os dentes das duas arcadas quando falava e sorria. Realizou-se a avaliação clínica, fotografias e o escaneamento das arcadas, além da solicitação de exames complementares. Foi realizado o planejamento após um minucioso estudo do caso, inclusive com enceramento digital, para uma clara explicação à paciente. Devido à pouca disponibilidade óssea, foi proposto fazer enxertos prévios à instalação de implantes, como o levantamento de seio maxilar bilateral. Na região posterior da mandíbula, devido à proximidade com o nervo alveolar inferior, indicou-se a instalação de implantes curtos, que foram esplintados com as coroas protéticas. A reabilitação oral foi realizada em etapas, aguardando os prazos preconizados para a cicatrização nas várias fases do tratamento. Após a instalação de provisórios sobre os implantes inferiores, estes serviram de ancoragem para realizar o alinhamento dos dentes anteriores inferiores por meio de alinhadores "in office", com o objetivo de preparar esses elementos para receberem facetas, com desgastes minimamente invasivos. Na região anterior superior, foi confeccionada uma PPF (Prótese Parcial Fixa) dentogengival em Zircônia que foi aparafusada nos minipilares instalados sobre os implantes. Nos implantes posteriores superiores, foram cimentadas coroas sobre os 4 pilares sólidos. Dessa forma, conseguiu-se estabilizar a oclusão em uma nova Dimensão Vertical de Oclusão (DVO), realizando restaurações cerâmicas e plásticas, o que reabilitou a função mastigatória, a estética e a autoestima da paciente.

Palavras-chave: Prótese Dentária; Implantes Dentários; Estética Dentária.